

## **ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

## Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

### Aspirin 500 mg αναβράζοντα δισκία

ακετυλοσαλικυλικό οξύ

**Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.**

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
- Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από 3 ημέρες (για την ημικρανία) ή μετά από 3-5 ημέρες (για τον πόνο και τον πυρετό).

#### Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Aspirin και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Aspirin
3. Πώς να πάρετε το Aspirin
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Aspirin
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

#### 1. Τι είναι το Aspirin και ποια είναι η χρήση του

Το Aspirin περιέχει ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη). Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ είναι ένα φάρμακο αναλγητικό (ανακουφίζει από τον πόνο) και αντιπυρετικό (μειώνει τον πυρετό).

Το Aspirin ενδείκνυται για:

- Πόνους μικρής ή μέτριας έντασης, όπως πονοκεφάλους, νευραλγίες, πόνους στους μυς και τις αρθρώσεις και γενικά πόνους μη σπλαγχνικής προέλευσης.
- Εμπύρετες γενικά καταστάσεις.
- Θεραπεία της οξείας φάσης της ημικρανίας με ή χωρίς αύρα.

#### 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Aspirin

##### Μην πάρετε το Aspirin

- σε περίπτωση αλλεργίας στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ, σε άλλα σαλικυλικά ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- εάν έχετε ιστορικό άσθματος που προκλήθηκε από τη χορήγηση σαλικυλικών ή φαρμάκων με παρόμοια δράση, ιδιαίτερα μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
- εάν έχετε έλκος στο στομάχι ή στο έντερο (συμπεριλαμβανομένου του δωδεκαδακτύλου).
- εάν έχετε ιστορικό αιμορραγιών του πεπτικού.
- εάν έχετε παθολογικά αυξημένη τάση προς αιμορραγία (αιμορραγική διάθεση).
- εάν έχετε σοβαρή ηπατική, νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια.
- σε επίκτητες και συγγενείς αιμορραγικές καταστάσεις.
- εάν υποβάλλεστε σε ηπαρινοθεραπεία.
- εάν λαμβάνετε θεραπεία με μεθοτρεξάτη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου και ορισμένων αυτοάνοσων παθήσεων) σε δόσεις ίσες ή μεγαλύτερες των 15

- mg/εβδομάδα.
- εάν βρίσκεστε στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης (βλέπε παρακάτω «Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα»).

Εάν έχετε αμφιβολίες για το εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

### **Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις**

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Aspirin.

Να αποφεύγετε τη μακροχρόνια χρήση σαλικυλικών χωρίς προηγούμενη ιατρική συμβουλή και παρακολούθηση.

### **Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με τη χρήση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος στις ακόλουθες περιπτώσεις:**

- εάν έχετε υπερευαισθησία σε αναλγητικά/αντιφλεγμονώδη/αντιρρευματικά φάρμακα ή εάν πάσχετε από άλλες αλλεργίες,
- εάν έχετε ιστορικό ελκών στο στομάχι ή στο έντερο, συμπεριλαμβανομένων των χρόνιων ή των υποτροπιάζοντων ελκών,
- εάν έχετε διαταραχές της πηκτικότητας (όπως υποπροθρομβιναιμία, αβιταμίνωση Κ),
- εάν παίρνετε ταυτόχρονα αντιπηκτικά φάρμακα (φάρμακα για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων στο αίμα),
- εάν η νεφρική λειτουργία ή η καρδιαγγειακή κυκλοφορία σας έχουν επηρεαστεί (π.χ. σε περιπτώσεις νεφραγγειακής νόσου, συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, μειωμένου όγκου αίματος, σοβαρής χειρουργικής επέμβασης, σήψης ή σε μείζονα αιμορραγικά συμβάματα), καθώς το ακετυλοσαλικυλικό οξύ μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τον κίνδυνο νεφρικής δυσλειτουργίας και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας,
- εάν έχετε μειωμένη ηπατική λειτουργία,
- εάν έχετε σοβαρή ανεπάρκεια του ενζύμου αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD) (μια κληρονομική νόσος που επηρεάζει τα ερυθρά αιμοσφαίρια), καθώς το ακετυλοσαλικυλικό οξύ μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων με απελευθέρωση αιμοσφαιρίνης (αιμόλυση ή αιμολυτική αναιμία). Παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αιμόλυσης είναι, για παράδειγμα, η υψηλή δοσολογία, ο πυρετός ή οι οξείες λοιμώξεις,
- εάν έχετε προϋπάρχον άσθμα, πυρετό εκ χόρτου, οίδημα του ρινικού βλεννογόνου (ρινικούς πολύποδες) ή χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος ή έχετε ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων (π.χ. δερματικές αντιδράσεις, κνησμό, κνίδωση) σε άλλη ουσία, καθώς το ακετυλοσαλικυλικό οξύ μπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασμο, κρίσεις άσθματος και άλλες αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

### **Παιδιά και έφηβοι**

**Δεν συνιστάται η χορήγηση αυτού του φαρμάκου σε παιδιά κάτω των 12 ετών χωρίς ιατρική οδηγία.**

Σε παιδιά και εφήβους που πάσχουν από ιογενείς ασθένειες και τους χορηγείται ακετυλοσαλικυλικό οξύ έχει παρατηρηθεί το σύνδρομο Reye, μια πολύ σπάνια αλλά δυνητικώς απειλητική για τη ζωή νόσος που απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Για τον λόγο αυτό, το Aspirin δεν πρέπει να λαμβάνεται από παιδιά ή εφήβους με ιογενείς παθήσεις (π.χ. γρίπη ή ανεμοβλογιά), με ή χωρίς πυρετό, εκτός εάν έχει δοθεί η σχετική συμβουλή από τον γιατρό.

Εάν παρουσιαστούν σημεία ζάλης ή λιποθυμία, μη φυσιολογική συμπεριφορά ή επίμονος έμετος σε παιδί που λαμβάνει ακετυλοσαλικυλικό οξύ, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας.

Η χρήση αυτού του φαρμάκου πρέπει να αποφεύγεται για 6 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό για ανεμοβλογιά.

### **Άλλα φάρμακα και Aspirin**

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, ακόμη και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.

Μην πάρετε το Aspirin:

- εάν λαμβάνετε θεραπεία με μεθοτρεξάτη σε δόσεις ίσες ή μεγαλύτερες των 15 mg/εβδομάδα.

Επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε ακετυλοσαλικυλικό οξύ με οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- μεθοτρεξάτη σε δόσεις μικρότερες των 15 mg/εβδομάδα
- αντιπηκτικά φάρμακα
- θρομβολυτικά φάρμακα
- άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
- εκλεκτικούς αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης
- διγοξίνη
- αντιδιαβητικά φάρμακα, όπως ινσουλίνη και σουλφονουριές
- φάρμακα για την αντιμετώπιση της κατακράτησης νερού (διουρητικά)
- αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης
- γλυκοκορτικοειδή (με εξαίρεση τη θεραπεία υποκατάστασης με υδροκορτιζόνη σε νόσο του Addison)
- βαλπροϊκό οξύ
- ουρικοζουρικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας (για παράδειγμα βενζοβρωμαρόνη, προβενεσίδη, σουλφινοπυραζόνη)
- αντιόξινα φάρμακα
- οξινοποιητικά των ούρων, όπως η βιταμίνη C
- φουροσεμίδη
- σπειρονολακτόνη
- μετοκλοπραμίδη
- αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης
- εμβόλιο ανεμοβλογιάς

### **Το Aspirin με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη**

Το Aspirin δεν πρέπει να λαμβάνεται με οινοπνευματώδη.

### **Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα**

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

#### *Κύηση*

#### **Κύηση – τελευταίο τρίμηνο**

Μην πάρετε το Aspirin εάν είστε στους τελευταίους 3 μήνες της εγκυμοσύνης, καθώς αυτό θα μπορούσε να βλάψει το αγέννητο παιδί σας ή να προκαλέσει προβλήματα κατά τον τοκετό. Μπορεί να προκαλέσει νεφρικά και καρδιακά προβλήματα στο αγέννητο μωρό σας. Μπορεί να επηρεάσει τη δική σας προδιάθεση και αυτή του μωρού σας για αιμορραγία και να προκαλέσει καθυστέρηση ή παράταση του τοκετού μεγαλύτερη από το αναμενόμενο.

#### **Κύηση – πρώτο και δεύτερο τρίμηνο**

Δεν πρέπει να παίρνετε το Aspirin κατά τους πρώτους 6 μήνες της εγκυμοσύνης εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο και συνιστάται από τον γιατρό σας. Εάν χρειάζεστε θεραπεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ή όσο προσπαθείτε να μείνετε έγκυος, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η χαμηλότερη δόση για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Εάν ληφθεί για περισσότερες από μερικές ημέρες από την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και έπειτα, το Aspirin μπορεί να προκαλέσει νεφρικά προβλήματα στο αγέννητο μωρό σας που μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλά επίπεδα αμνιακού υγρού που περιβάλλει το μωρό (ολιγοϋδράμνιο) ή σε στένωση ενός αιμοφόρου αγγείου (αρτηριακός πόρος) στην καρδιά του μωρού. Εάν χρειάζεστε θεραπεία για περισσότερες από μερικές ημέρες, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει πρόσθετη παρακολούθησή.

#### *Θηλασμός*

Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ και οι μεταβολίτες του απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα σε μικρές ποσότητες.

Καθώς δεν έχουν μέχρι στιγμής παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες στα βρέφη έπειτα από περιστασιακή χρήση, συνήθως δεν απαιτείται διακοπή του θηλασμού. Ωστόσο, εάν γίνεται τακτική χρήση ή λαμβάνονται υψηλές δόσεις, πρέπει να σταματήσετε τον θηλασμό.

#### *Γονιμότητα*

Με βάση κάποια περιορισμένα διαθέσιμα δημοσιευμένα δεδομένα, οι μελέτες στον άνθρωπο δεν έδειξαν σταθερή, επαναλαμβανόμενη βλαβερή επίδραση του σαλικυλικού οξέος στη γονιμότητα και δεν υπάρχουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία από τις μελέτες σε ζώα.

#### **Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων**

Το Aspirin δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

#### **Το Aspirin περιέχει νάτριο**

Το φάρμακο αυτό περιέχει 543,96 mg νατρίου (κύριο συστατικό μαγειρικού/επιτραπέζιου αλατος) σε κάθε δισκίο. Αυτό ισοδυναμεί με το 27,2 % της συνιστώμενης μέγιστης ημερήσιας πρόσληψης νατρίου με τη διατροφή για έναν ενήλικα.

### **3. Πώς να πάρετε το Aspirin**

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

#### Δοσολογία

Η συνιστώμενη δόση είναι:

#### Ενήλικες και παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 12 ετών

- **Αναλγητικό-αντιπυρετικό:** 1 - 2 αναβράζοντα δισκία ως εφάπαξ δόση, που μπορεί να επαναλαμβάνεται, όπως απαιτείται, μετά από διάστημα όχι μικρότερο από 4 ώρες. Η μέγιστη ημερήσια δόση των 8 δισκίων δεν πρέπει να υπερβαίνεται.
- **Θεραπεία της οξείας φάσης της ημικρανίας με ή χωρίς αύρα:** 2 αναβράζοντα δισκία χορηγούμενα ως εφάπαξ δόση. Εάν η ημικρανία συνεχίζεται, η δόση μπορεί να επαναληφθεί ανά 4-8 ώρες. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της μέγιστης ημερήσιας δόσης των 6 δισκίων. Τα δισκία δεν πρέπει να χορηγούνται για περισσότερες από 3 ημέρες χωρίς τη συμβουλή γιατρού.

#### Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 12 ετών και σωματικού βάρους 33,3-50 kg

Το φάρμακο αυτό συνιστάται για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 12 ετών μόνο υπό την επίβλεψη γιατρού.

- **Αναλγητικό:** 10 mg/kg/4 ώρες ή 15 mg/kg/6 ώρες, έως 60 mg/kg/ημέρα.
- **Αντιπυρετικό:** Δεν συνιστάται η χορήγησή του σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 12 ετών.
- **Θεραπεία της οξείας φάσης της ημικρανίας με ή χωρίς αύρα:** Δεν συνιστάται η χορήγησή του σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 12 ετών.

Σε περίπτωση ακούσιας λήψης ή χορήγησης σε παιδιά, βλέπε «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις».

#### Ειδικοί πληθυσμοί

Το φάρμακο αυτό αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια.

Ασθενείς με μη φυσιολογική ηπατική ή νεφρική λειτουργία: Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.

#### Διάρκεια θεραπείας

Μην πάρετε αυτό το φάρμακο για περισσότερες από 3 ημέρες (για την ημικρανία) ή 3 - 5 ημέρες (για τον πόνο και τον πυρετό) χωρίς τη συμβουλή του γιατρού σας.

#### Τρόπος χορήγησης

Από στόματος χρήση. Τα αναβράζοντα δισκία πρέπει να διαλύονται σε ένα ποτήρι νερό πριν ληφθούν.

#### **Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Aspirin από την κανονική**

Είναι πιθανό να εμφανίσετε βουητό στα αυτιά, αίσθηση απώλειας της ακοής, πονοκεφάλους, ζάλη, ναυτία, έμετο, ίλιγγο, εφίδρωση, σύγχυση - αυτά είναι χαρακτηριστικές ενδείξεις υπερδοσολογίας. Σε μικρά παιδιά και σε ηλικιωμένα άτομα μπορεί να προκληθεί δηλητηρίαση από σαλικυλικά χωρίς να προηγηθούν βουητό στα αυτιά, αίσθηση απώλειας της ακοής κ.λπ.

Σε περίπτωση υπογίας υπερδοσολογίας με αυτό το φάρμακο, σταματήστε τη θεραπεία και επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει σχετικά με τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπερδοσολογίας/δηλητηρίασης.

#### **Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Aspirin**

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

### **4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες**

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι γαστρεντερικές διαταραχές (άνωτερου και κατώτερου γαστρεντερικού) αποτελούν τη συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια και συμπεριλαμβάνουν συνηθισμένα συμπτώματα δυσπεψίας, γαστρεντερικό και επιγαστρικό πόνο, σπανιότερα γαστρεντερική φλεγμονή και γαστρικό έλκος (αλλά όχι δωδεκαδακτυλικό) που ενδέχεται πολύ σπάνια να οδηγήσει σε αιμορραγία γαστρικού έλκους και διάτρηση, με τα αντίστοιχα εργαστηριακά και κλινικά σημεία και συμπτώματα.

Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί νόσος του εντερικού διαφράγματος, ιδιαίτερα κατά τη μακροχρόνια θεραπεία (μη γνωστή συχνότητα). Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες από τον γαστρεντερικό σωλήνα είναι η πρόκληση επιπολής εξελκώσεων και η ενεργοποίηση παλιού γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους.

Έχουν επίσης αναφερθεί ναυτία, καύσος, επιγαστρική δυσφορία και έμετοι σε ποσοστό 10-30% με σχετικά μεγάλες δόσεις. Απώλεια αίματος, αν και συνήθως αμελητέα, αναφέρεται στο 70%.

Η χρόνια λήψη σαλικυλικών μπορεί να οδηγήσει σε σιδηροπενική αναιμία. Επίσης, η σύγχρονη χορήγηση σαλικυλικών με τροφή δεν μειώνει την πιθανότητα απώλειας αίματος.

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας με αντίστοιχες εργαστηριακές και κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αναπνευστική νόσο επιδεινούμενη από το ακετυλοσαλικυλικό οξύ, ήπιες έως μέτριες αντιδράσεις που δυνητικά επηρεάζουν το δέρμα, την αναπνευστική οδό, τη γαστρεντερική οδό και το καρδιαγγειακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων συμπτωμάτων όπως εξάνθημα, κνίδωση, οίδημα, κνησμός, ρινίτιδα, ρινική συμφόρηση, καρδιοαναπνευστική δυσχέρεια, και πολύ σπάνια, σοβαρές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναφυλακτικής καταπληξίας.

Έχει πολύ σπάνια αναφερθεί παροδική ηπατική δυσλειτουργία με αύξηση των τρανσαμινασών του ήπατος.

Έχουν αναφερθεί ζάλη και εμβοές των ωτών, τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν υπερδοσολογία.

Έχουν αναφερθεί αιμόλυση και αιμολυτική αναιμία σε ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια του ενζύμου αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD).

Έχουν αναφερθεί νεφρική δυσλειτουργία και οξεία νεφρική βλάβη.

#### **Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών**

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών

χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>).

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

## **5. Πώς να φυλάσσετε το Aspirin**

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία μετά το «ΛΗΞΗ/EXP». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην χρησιμοποιήσετε το φάρμακο.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

## **6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες**

### **Τι περιέχει το Aspirin**

- Η δραστική ουσία είναι το ακετυλοσαλικυλικό οξύ.  
Κάθε αναβράζοντα δισκίο Aspirin περιέχει 500 mg ακετυλοσαλικυλικού οξέος.
- Τα άλλα συστατικά είναι άνυδρο δισόξινο κιτρικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, κιτρικό οξύ και ανθρακικό νάτριο.

### **Εμφάνιση του Aspirin και περιεχόμενα της συσκευασίας**

Λευκά, στρογγυλά δισκία, διαμέτρου 25,4 mm, με τυπωμένο τον σταυρό Bayer στην μία όψη και καμία ένδειξη στην άλλη.

Κουτί που περιέχει 12 αναβράζοντα δισκία (2 ταινίες αλουμινίου των 6 δισκίων).

Κουτί που περιέχει 24 αναβράζοντα δισκία (2 ταινίες αλουμινίου των 12 δισκίων).

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

### **Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής**

#### **Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:**

BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE

Αγησιλάου 6-8,

Μαρούσι 151 23, Αττική,

Ελλάδα

Τηλ.: 0030 210 6187500

#### **Παρασκευαστής:**

Bayer Bitterfeld GmbH

OT Greppin

Salegaster Chaussee 1

06803 Bitterfeld-Wolfen

Γερμανία

**Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο 2023.**